# El Cáncer del tubo digestivo II. Cáncer Gástrico

Autor J.A. Muniesa Soriano y J.M. Lázaro Maisanava

## Introducción

José Angel
Muniesa Soriano y José Miguel Lázaro Maisanava

Registro de Tumores
del Hospital Obispo Polanco de Teruel

El cáncer de estómago es el 5º tumor en frecuencia del área sanitaria de Teruel (5'9% de todos los tumores, 6'4% de los diagnosticados en el varón y 5'2% de los tumores en la mujer). Anualmente se diagnostican 18 nuevos casos en el hombre y 10 en la mujer por cada 100.000 habitantes. No obstante, constituye la primera causa de defunción por cáncer (el 15% de los fallecimientos por tumores, según los datos ofrecidos por el Departamento de Sanidad y Consumo de la D.G.A., 1.990).

El adenocarcinoma es el tipo histológico en el 90% de los tumores, integrando el otro 10% linfomas, sarcomas y otras raras neoplasias. Podemos distinguir, según la localización gástrica del tumor, dos entidades con diferentes características clínico-patológicas y pronósticas : un tipo de cáncer gástrico distal (antral) y otro proximal (cardial). El carcinoma localizado distalmente está disminuyendo lentamente en los países desarrollados por causas todavía desconocidas, pero probablemente relacionadas con la mejor conservación de los alimentos (refrigeración) y la menor prevalencia de infección por Helicobacter pylori. Suele acompañarse de fenómenos de gastritis atrófica multifocal y metaplasia intestinal en la mucosa adyacente. Se cura globalmente en el 50% de los pacientes y en el 85-95% de los descubiertos en etapas tempranas. Lamentablemente sólo se encuentra en estos estadíos iniciales en el 10-20% de los casos. La supervivencia a los 5 años disminuye del 50 al 0% cuando el cáncer gástrico es diseminado e inoperable.
El carcinoma gástrico proximal (cardias) no se asocia con metaplasia intestinal y comparte características con el carcinoma originado en el esófago de Barrett. La supervivencia a los 5 años sólo alzanza el 10-15%, hecho relacionado con la diseminación precoz del tumor.

| Tumores | Porcentaje |
|---|---|
| Estómago | 15'02% |
| Colorrectal | 13'9% |

Pulmón
13'9%

Próstata
7'5%

Mama
4'4%

Vejiga
4'1%

Páncreas
2'8%

Leucemias
2'6%

Encéfalo
2'3%

Esófago
2'0%

Orofaringe
1'8%

Hígado
1'3%

Cérvix
0'7%

Endometrio
0'5%

Primitivo ?
4'9%

Otros
16'3%